

AMIXEN PLUS

AMOXICILINA 500 mg

DICLOFENAC 25 mg

Comprimidos recubiertos**Composición:****Cada comprimido recubierto contiene:**

| | |
|--|----------|
| Amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) | 500 mg |
| Diclofenac potásico | 25 mg |
| Celactosa | 50 mg |
| Crospovidona | 15 mg |
| Hidroxiopropilmetilcelulosa/dióxido de titanio/triacetina/ Lactosa /Óxido hierro/FD&C Blue 1 | 19,51 mg |
| Estearato de magnesio. | 5,7 mg |
| Simeticona emulsionada al 30 % | 487 mcg |
| Celulosa microcristalina c.s.p. | 800 mg |

Acción farmacológica y terapéutica: AMIXEN PLUS asocia amoxicilina y diclofenac potásico ejerciendo acciones antibiótica, antiinflamatoria y analgésica. La amoxicilina es un antibiótico β lactámico del grupo de las aminopenicilinas con un amplio espectro de actividad bactericida frente a la mayoría de los microorganismos grampositivos y gramnegativos. El Diclofenac potásico es un antiinflamatorio-analgésico no esteroideo que actúa disminuyendo la formación de precursores de las prostaglandinas.

Indicaciones: AMIXEN PLUS está indicado en procesos inflamatorio-infecciosos agudos o crónicos en otorrinolaringología (faringoamigdalitis, abscesos periamigdalinos, sinusitis), odontología (cirugía maxilofacial, infecciones gingivales y alveolares), ginecología y obstetricia (abscesos mamarios, anexitis, infecciones postparto) y cirugía (fracturas expuestas, abscesos, postoperatorios).

Efectos adversos: Se puede observar: Manifestaciones de hipersensibilidad: rash cutáneo, urticaria.

Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, alteración de las pruebas hepáticas. Raramente: úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, hepatitis. Trastornos neurológicos: mareos, vértigo, cefaleas. En casos aislados: discrasias sanguíneas, púrpura, anomalías de la función renal.

Precauciones y advertencias: Se recomienda investigar acerca de antecedentes sobre reacciones alérgicas a otros antibióticos y/o antiinflamatorios no esteroideos. "Basada en la presencia de lactosa se contraindica su uso en galactosemia congénita, síndrome de mala absorción de glucosa y de galactosa o deficiencia de lactasa."

Administrar con precaución en casos de: • Antecedentes de alergia (asma, urticaria) • Antecedentes de enfermedades gastrointestinales, insuficiencia hepática, cardíaca o renal • Porfiria • Pacientes con depleción de volumen extracelular por cualquier causa.

En pacientes con insuficiencia renal severa, la dosis debe ajustarse de acuerdo al clearance de creatinina.

Si es necesario prolongar el tratamiento, se recomienda el control periódico de la función hepática y del cuadro hemático.

Interacciones con otras drogas: AMIXEN PLUS se debe administrar con precaución a pacientes en tratamiento con diuréticos, anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, otros antiinflamatorios no esteroideos.

Contraindicaciones: AMIXEN PLUS está contraindicado en: • Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes o a otras drogas inhibidoras de la prostaglandina-sintetasa o a las penicilinas y/o cefalosporinas. • Embarazo y lactancia. • Menores de 12 años. • Úlcera gastroduodenal.

• Insuficiencia renal y/o hepática severas. • En presencia de infecciones por herpes virus, mononucleosis infecciosa o en pacientes bajo tratamiento con allopurinol.

Posología habitual y modo de empleo: La posología orientativa habitual es la siguiente: 1 comprimido recubierto cada 8 horas o según indicación médica.

Presentación: Envases con 8 y 16 comprimidos recubiertos.

"Mantener fuera del alcance de los niños".

"Conservar en lugar seco, a una temperatura entre 15° y 30° C.

"Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría: Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247/6666 Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777".

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 43.985

Director Técnico: Vicente López González, Farmacéutico.

"Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica."



Laboratorios Bernabé

Laboratorios Bernabé S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA., Tel.: 4501-3278/79, www.laboratoriosbernabo.com

Elaboración: Pedro Morán 2556, C1419HJJ, Ciudad Autónoma de Bs. As.